

**ABSTRACTS
IN
PERSIAN**

The Subtree Size Profile of Bucket Recursive Trees

Ramin Kazemi

Department of Statistics, Imam Khomeini International University,
Qazvin, Iran.

کاظمی (۲۰۱۴) نسخه‌ی جدیدی از درخت‌های بازگشتی سطلی را به عنوان تعمیم دیگری از درخت‌های بازگشتی که در آن سطل‌ها ظرفیت‌های متغیر دارند، معرفی کرد. در این مقاله، گشتاورهای فاکتوریل p -ام متغیر تصادفی $S_{n,1}$ که تعداد نمایه‌ی زیر درخت‌های اندازه‌ی یک (برگ‌ها) را می‌شمارد، محاسبه و یک تغییر فاز از این متغیر را نشان می‌دهیم. این نتایج با حل کردن یک معادله دیفرانسیلی جزئی مرتبه اول برای تابع مولد متناظر با این کمیت به دست می‌آیند.

Tangent Bundle of the Hypersurfaces in a Euclidean Space

Sharief Deshmukh, Suha B. Al-Shaikh

Department of Mathematics, College of Science, King Saud University,
P. O. Box # 2455, Riyadh-11451, Saudi Arabia.

فرض کنید M یک ابررویبه جهت‌پذیر در فضای اقلیدسی R^{2n} با متر القایی g و TM کلاف مماس آن باشد. می‌دانیم که کلاف مماس TM متر \bar{g} القایی به عنوان یک زیرخمینه از فضای اقلیدسی R^{4n} دارد. که یک متر طبیعی نیست، به این مفهوم که فرونشاندن $\pi: (TM, \bar{g}) \rightarrow (M, g)$ یک فرونشاندن ریمانی نیست. در این مقاله، ما از این واقعیت که R^{4n} کلاف مماس فضای اقلیدسی R^{2n} است برای تعریف یک ساختار مختلط خاص \bar{J} روی کلاف مماس R^{4n} استفاده می‌کنیم. در نتیجه $(R^{4n}, \bar{J}, \langle, \rangle)$ یک خمینه کیلری است، که \langle, \rangle متر اقلیدسی است و همچنین متر اساسی کلاف مماس R^{4n} می‌باشد. ما ساختار القایی روی کلاف مماس (TM, \bar{g}) از ابررویبه M که یک زیرخمینه از خمینه کیلری $(R^{4n}, \bar{J}, \langle, \rangle)$ است را بررسی می‌کنیم. نشان می‌دهیم که کلاف مماس TM یک CR -زیرخمینه از خمینه کیلری $(R^{4n}, \bar{J}, \langle, \rangle)$ است. ما شرایطی را می‌یابیم که تحت آنها خمینه کیلری (TM, \bar{g}) روی کلاف مماس (TM, \bar{g}) میدان برداری کیلینگ هستند. همچنین نشان داده شده است که کلاف مماس TS^{2n-1} از کره S^{2n-1} یک متر ریمان \bar{g} را می‌پذیرد و یک میدان برداری کیلینگ غیر بدیهی روی کلاف مماس (TS^{2n-1}, \bar{g}) وجود دارد.

Double Integral Characterization for Bergman Spaces

Mostafa Hassanlou^a, Hamid Vaezi^b

^aShahid Bakeri High Education Center of Miandoab, Urmia University, Urmia, Iran.

^bFaculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

در این مقاله، فضاهای برگمن را نسبت به انتگرال دوگانه‌ی توابع $\frac{|f(z) - f(w)|}{|z - w|}$ ، $\frac{|f(z) - f(w)|}{\beta(z, w)}$ و $\frac{|f(z) - f(w)|}{\rho(z, w)}$ که β و ρ مترهای هذلولوی و شبه هذلولوی هستند مشخصه‌سازی می‌کنیم. شرایط لازم و کافی برای اینکه یک تابع عضو فضاهای برگمن باشد را بدست می‌آوریم.

Convergence of an Approach for Solving Fredholm Functional Integral Equations

Nasser Aghazadeh, Somayeh Fathi

Department of Applied Mathematics, Azarbaijan Shahid Madani University,
Tabriz, Iran.

در این کار ما برای حل یک معادله انتگرال تابعی فردهولم (FIE) نوع دوم یک روش ضرب نیستروم ارائه می‌دهیم. با این روش حل، FIE حل یک سیستم جبری از معادلات را کاهش می‌دهد. سپس ما از برخی قضایا برای اثبات یکتایی و وجود سیستم استفاده می‌کنیم. سرانجام همگرایی روش را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

The Representations and Positive Type Functions of Some Homogenous Spaces

R. Raisi Tousi^a, F. Esmaeelzadeh^b, R. A. Kamyabi Gol^c

^aDepartment of Mathematics, Ferdowsi University Of Mashhad, P. O. Box
1159-91775, Mashhad, Iran.

^bDepartment of Mathematics, Bojnourd Branch, Islamic Azad University,
Bojnourd, Iran.

^cDepartment of Pure Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, and
Center of Excellence in Analysis on Algebraic Structures (CEAAS), P.O.Box
1159-91775, Mashhad, Iran.

برای فضای همگن $\frac{G}{H}$ که G حاصلضرب نیم گروه از زیرگروه بسته H و زیرگروه نرمال K از G می باشد، نشان می دهیم پیچش روی فضای باناخ $L^1(\frac{G}{H})$ توسط پیچش روی جبر باناخ $L^1(K)$ تعریف می شود. همچنین تناظر یک به یک بین $*$ - نمایش های نامنفرد از $L^1(\frac{G}{H})$ و نمایش هایی از $\frac{G}{H}$ معرفی می گردد و نیز رابطه بین نمایش های دوری از $L^1(\frac{G}{H})$ و توابع مثبت معین روی فضای همگن بیان می شود. در پایان نشان می دهیم که قضیه گلفند راکف برای فضای همگن $\frac{G}{H}$ برقرار است اگر و فقط اگر H نرمال باشد.

Stability of g-Frame Expansions

A. Abdollahi^a, E. Rahimi^b

^aDepartment of Mathematics, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz
71454, Iran.

^bDepartment of Mathematics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz,
Iran.

در این مقاله پایداری اختلال یک طرفه بسط قاب تعمیم یافته را بررسی می‌کنیم. ما نشان می‌دهیم که اگر $\Lambda = \{\Lambda_i\}_{i \in I}$ یک قاب تعمیم یافته برای فضای هیلبرت H باشد و $\bar{f} = \sum_{i \in J} \Lambda_i^\circ \bar{\Lambda}_i^a f$ و همچنین جائیکه $\theta_i \in L(H, H_i)$ و $\Lambda_i^a = \Lambda_i + \theta_i$ برای $i \in J$ و $\hat{f} = \sum_{i \in J} (\Lambda_i^a)^\circ \bar{\Lambda}_i f$ و $\|\hat{f} - f\| \leq \alpha \|f\|$ و β داریم $\|f - \bar{f}\| \leq \beta \|f\|$.

An Explicit Viscosity Iterative Algorithm for Finding Fixed Points of Two Noncommutative Nonexpansive Mappings

H. R. Sahebi, A. Razani

Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

یک الگوریتم تکرار چسبده صریح برای بدست آوردن عضو مشترکی از مجموعه جواب‌های دستگاه مسئله تعادل تعمیم یافته و مجموعه نقاط پایدار مشترک خود نگاشت‌های غیر انبساطی ناجابجا در فضای هیلبرت حقیقی ارائه می‌دهیم.

On (α, β) -Linear Connectivity

Fatemah Ayatollah Zadeh Shirazi^a, Arezoo Hosseini^b

^aFaculty of Mathematics, Statistics and Computer Science, College of Science, University of Tehran, Enghelab Ave., Tehran, Iran.

^bFarhangian University (Pardis Nasibe-Shahid Sherafat branch), tehran, P.O.Box 19396-14464, Iran.

در این مقاله به ازای اعداد اصلی ناصفر α و β ، فضاهای (α, β) -همبند خطی را معرفی نموده و نشان می‌دهیم مفهوم (α, β) -همبندی خطی ابزاری به جهت رده‌بندی کلاس فضاهای همبند خطی توپولوژیک است.

Coincidence Points and Common Fixed Points for Expansive Type Mappings in b -Metric Spaces

Sushanta Kumar Mohanta

Department of Mathematics, West Bengal State University, Barasat,
24 Parganas (North), West Bengal, Kolkata 700126, India

مهمترین هدف این مقاله به دست آوردن شرایط کافی برای وجود نقاط هم-وقوع و نقاط پایدار مشترک برای یک جفت از خودنگاشت‌هایی که در برخی از شرایط نوع گسترده از فضاهای b -متریک صدق می‌کنند است. سرانجام بررسی می‌کنیم که هم‌ارزی یکی از این نتایج در مفهوم فضاهای b -متریک مخروطی به وسیله تکنیک‌های استفاده شده برای توابع اسکالر ساز به دست نمی‌آید. این مقاله چندین نتیجه شناخته شده و قابل مقایسه‌ی موجود را گسترش و تعمیم می‌دهد.

On Harmonic Index and Diameter of Unicyclic Graphs

J. Amalorpava Jerline^a, L. Benedict Michaelraj^b

^aDepartment of Mathematics, Holy Cross College, Trichy 620 002, India

^bDepartment of Mathematics, St. Joseph's College, Trichy 620 002, India

اندیس هارمونیک $H(G)$ از یک گراف G به صورت مجموع وزنهای
 $\frac{2}{d(u)+d(v)}$ از همه یالهای uv در G تعریف شده است، جاییکه $d(u)$
 نشاندهنده درجه راس u در G است. در این مقاله ما حدس
 $\frac{H(G)}{D(G)} \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{3(n-1)}$ را که در سال ۲۰۱۳ بوسیله جیانژی لیو ارائه شده است
 ثابت می‌کنیم که در آن G یک گراف تک دور است. همچنین یک کران بهتر
 $\frac{H(G)}{D(G)} \geq \frac{1}{2} + \frac{2}{3(n-2)}$ ارائه می‌دهیم که در آن n مرتبه و $D(G)$ قطر گراف G
 است.

Fixed Point Results on b -Metric Space via Picard Sequences and b -Simulation Functions

Marta Demma^a, Reza Saadati^b, Pasquale Vetro^a

^aUniversit`a degli Studi di Palermo, Dipartimento di Matematica e Informatica, Via Archirafi, 34, 90123 Palermo, Italy.

^bDepartment of Mathematics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

اخیراً در یک مقاله خجسته و همکارانش (F. Khojasteh, S. Shukla, S. Radenovic, A)
 new approach to the study of fixed point theorems via simulation functions,
 (Filomat, 29 (2015), 1189-1194) کلاس جدیدی از توابع شبیه سازی را با قابلیت
 وحدت بخش روی شرایط انقباضی شناخته شده با نام Z -انقباضها ارائه کرده اند. با
 ادامه این مسیر تحقیقاتی ما نتایج آنها را روی یک زمینه b -متریک با ارائه مفهومی
 جدید تابع b -شبیه ساز گسترش و تعمیم می دهیم. سپس ما تعدادی نتایج نقطه‌ی پایدار
 در ارتباط با موارد موجود بحث و اثبات می کنیم.

Tricyclic and Tetracyclic Graphs with Maximum and Minimum Eccentric Connectivity

M. Tavakoli^a, F. Rahbarnia^a and A. R. Ashrafi^{b,c}

^aDepartment of Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad, P. O. Box 1159, Mashhad 91775, Iran.

^bDepartment of Pure Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Kashan, Kashan 87317-51167, I. R. Iran.

^cInstitute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan, Kashan 87317-51167, I. R. Iran.

فرض کنیم G یک گراف همبند n -رأسی باشد. در اینصورت G گراف سه دور نام دارد اگر دارای $n+2$ یال باشد و گراف چهار دور نام دارد اگر دارای دقیقاً $n+3$ یال باشد. فرض کنید C_n و D_n به ترتیب مجموعه‌ی گراف‌های سه دور و چهار دور n -رأسی را نشان دهند. هدف از این مقاله، محاسبه‌ی ماکزیمم و مینیمم مقدار شاخص همبندی خروج از مرکز در C_n و D_n می‌باشد.