

**Abstracts  
in  
Persian**

**New Jensen and Ostrowski Type Inequalities for General  
Lebesgue Integral with Applications**

S. S. Dragomir<sup>a,b</sup>

<sup>a</sup>Mathematics, College of Engineering & Science, Victoria University,  
PO Box 14428 Melbourne City, MC 8001, Australia.

<sup>b</sup>School of Computational & Applied Mathematics, University of the  
Witwatersrand, Private Bag 3, Johannesburg 2050, South Africa.

برخی نامعادلات جدید مرتبط با نامعادلات جنسن و اوستراوسکی برای انتگرال لیگ کلی به دست آمده است. همچنین  
کاربردهایی برای اندازه  $f$ -واگرایی ارائه شده است.

## ***m-Ary Hypervector Space: Convergent Sequence and Bundle Subsets***

S. Ostadhadi- Dehkordi

Department of Mathematics, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.

در این مقاله، مفهوم فضای برداری با در نظر گرفتن آبرگروه کانونی  $m$ -تایی به جای گروه، آبرمیدان کراسنر  $(m, n)$ -تایی به جای میدان و آبرضرب اسکالار به جای ضرب اسکالار تعمیم داده شده است. در ادامه مفاهیم آبرفضاهای برداری  $m$ -تایی نرمدار، همگرایی دنباله در آبرفضای نرمدار و مجموعه بسته معرفی می‌شوند.

## On Direct Sum of Branches in Hyper *BCK*-algebras

Habib Harizavi

Department of Mathematics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran.

در این مقاله، مفهوم جمع مستقیم شاخه‌ها در ابر  $BCK$  - جبرها معرفی می‌شود و بعضی از خواص آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بکار بردن این مفهوم در نیم مشبکه‌های پائینی ابر  $BCK$  ها، یک شرط لازم و کافی برای اینکه یک  $BCK$  - ایدآل، یک ایدآل اول باشد ارائه می‌گردد. همچنین بعضی از خواص ابر  $BCK$  - زنجیرها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در نهایت، اثبات می‌شود که اگر  $H$  - یک ابر  $BCK$  - زنجیر و به ازای هر  $a \in H$ ، مجموعه‌ی  $(a)$  متناهی باشد، آن‌گاه  $. |Aut(H)| = 1$

## Applying Legendre Wavelet Method with Regularization for a Class of Singular Boundary Value Problems

Aram Azizi<sup>a</sup>, Jamshid Saeidian<sup>b</sup>, Sarkout Abdi<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Department of Mathematics, Payame Noor University, PO Box 19395-3697  
Tehran, Iran.

<sup>b</sup>Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi University, 50  
Taleghani avenue, Tehran, 1561836314, Iran.

<sup>c</sup>Department of sciences and engineering, Marivan Branch, Islamic Azad  
University, Marivan, Kordestan, Iran.

در این مقاله پایه موجک لژاندر برای بدست آوردن جواب تقریبی یک نوع مساله مقدار مرزی منفرد که در فیزیولوژی کاربرد دارد، بکار می‌رود. زمانی که تعداد توابع پایه را افزایش می‌دهیم دستگاه معادلات خطی بدست آمده بد وضع خواهد بود (بدلیل منفرد بودن). به منظور رفع این مشکل در این حالت از منظم سازی تیخونوف برای برطرف کردن بد وضعی مساله استفاده می‌کنیم. این روش بر روی برخی مسایل کاربردی به منظور بررسی کارایی و دقیقیت روش اعمال می‌شود.

## An Implicit Difference-ADI Method for the Two-dimensional Space-time Fractional Diffusion Equation

F. Nasrollahzadeh, S. M. Hosseini

Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences,  
Tarbiat Modares University, P.O.Box:14115-175, Tehran, Iran.

معادلات انتشار با مرتبه کسری تعمیمی از معادلات انتشار کلاسیک می باشد که برای مدل سازی در فیزیک، ریاضیات مالی، مهندسی و ... به کار می روند. در این مقاله از روش تفاضلی ضمنی همراه با روش ضمنی جهت های متناوب (ADI) برای حل معادله انتشار کسری روی زمان و مکان دو بعدی در یک دامنه محدود استفاده می شود. سازگاری، پایداری بدون شرط و همگرایی مرتبه اول این روش اثبات شده است. تعدادی مثال عددی که دارای جواب های دقیق می باشند، با این روش حل شده اند و رفتار خطای آن ها به منظور نشان دادن مرتبه همگرایی بررسی شده است.

## Representations of Double Coset Lie Hypergroups

M. Toomanian<sup>a</sup>, M. Amini<sup>b</sup>, A. Heydari<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Department of Mathematics, College of Basic Sciences, Karaj-Branch,  
Islamic Azad University, Alborz, Iran.

<sup>b</sup>Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Tarbiat  
Modares University, Tehran 14115-134, Iran.

در این مقاله فضای دو همدسته یک گروه لی توسط یک زیر گروه فشرده مطالعه می شود. نشان می دهیم فرمول وایل برای ابر گروه دو همدسته لی برقرار است و برخی نمایش های گروه لی به نمایشی از ابر گروه دو همدسته لی گسترش می یابد. ما بردارهای هموار (تحلیلی) نمایش های توسعی یافته فوق را مشخص می کنیم.

## Stability Analysis of Mathematical Model of Virus Therapy for Cancer

Akram Ashyani, Hajimohammad Mohammadinejad, Omid RabieiMotlagh

Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Birjand, Iran.

در این مقاله به بررسی مدل ریاضی برای مطالعه رابطه بین سلول‌های تومور و ویروس‌های انکولیتیک، می‌پردازیم. به کمک نظریه پایداری معادلات دیفرانسیل، مدل را تجزیه و تحلیل می‌نماییم و شرایطی برای پایداری سرتاسری نقاط تکین بدینهی و درونی به دست می‌آوریم.

## Linear Functions Preserving Sut-Majorization on $R^n$

Asma Ilkhanizadeh Manesh

Department of Mathematics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, P.O. Box:  
7713936417, Rafsanjan, Iran.

فرض کنید  $M_n$  فضای برداری ماتریس‌های حقیقی  $n \times n$  و  $R^n$  مجموعه‌ی بردارهای حقیقی  $n \times 1$  باشند. ماتریس  $R \in M_n$  سطري زيرتصادفي گفته می‌شود اگر دراييه‌های نامنفی داشته باشد و هر مجموع سطري آن حداکثر يك باشد. برای  $x, y \in R^n$ , گويم  $x$  توسط  $suty$ -مهتری برداری می‌شود (و با نماد  $x <_{sut} y$  مشخص می‌شود) اگر ماتریس سطري  $T : R^n \rightarrow R^n$  زيرتصادفي بالا مثلثی  $n \times n$ ,  $R$  ای وجود داشته باشد به طوری که  $y = Rx$ . در این کار توابع خطی  $T$  با شرط اضافی  $T_{e_i} \neq 0$  (به ترتیب، نگهدارنده‌ی قوی) را مشخص می‌کنیم.

## Double Sequence Iteration for a Strongly Contractive Mapping in the Modular Space

Razani and R. Moradi

Department of Mathematics, Faculty of Science, Imam Khomeini International University (IKIU), Postal code 34149-16818, Qazvin, Iran.

در این مقاله دو دنباله دوتای تکرارشونده برای یک نگاشت قویاً  $\rho$ -انقباضی در فضای مدولار معرفی شده است. همگرایی این دنباله‌های تکرار شونده به نقطه ثابتی از یک نگاشت قویاً  $\rho$ -انقباضی ثابت خواهد شد. در پایان چند مثال مبنی بر جدید بودن نتیجه اصلی ارائه شده است.

## Additive Maps Preserving Idempotency of Products or Jordan Products of Operators

Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh\_, Hamid Rohi

Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of  
Mazandaran, P. O. Box 47416-1468, Babolsar, Mazandaran, Iran.

فرض کنید  $B(K)$  و  $B(H)$  به ترتیب جبر تمام عملگرهای خطی کران دار روی فضاهای هیلبرت  $H$  و  $K$  باشند. در این مقاله فرم نگاشتهای جمعی از  $B(K)$  به  $B(H)$  که خودتوانی ناصفر ضرب جردن یا ضرب معمولی عملگرها را از دو طرف حفظ می‌کنند، به دست می‌آید.

## On the Wiener Index of Some Edge Deleted Graphs

B. S. Durgi<sup>a</sup>, H. S. Ramane<sup>b</sup>, P. R. Hampiholi<sup>c</sup>, S. M. Mekkalike<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Department of Mathematics, KLE Dr. M. S. Sheshgiri College of Engineering and Technology, Belgaum 590008, India.

<sup>b</sup>Department of Mathematics, Karnatak University Dharwad, Dharwad - 580001, India.

<sup>c</sup>Department of Master of Computer Applications, Gogte Institute of Technology, Belgaum - 590008, India.

<sup>d</sup>Department of Mathematics, KLE College of Engineering and Technology, Chikodi- 591201, India.

فاصله ها بین همه زوج راسها در یک گراف همبند به شاخص وینر گراف شناخته می شود. در این مقاله، ما شاخص وینر گراف متمم ستاره ها و همچنین زیر گراف ها و دورها در  $k_n$  را محاسبه خواهیم کرد.