

**ABSTRACTS
IN
PERSIAN**

A Successive Numerical Scheme for Some Classes of Volterra-Fredholm Integral Equations

A. Hashemi Borzabadi, M. Heidari

School of Mathematics and Computer Science, Damghan University,
Damghan, Iran.

در این مقاله، یک روش تکراری قابل اعتماد برای حل دسته وسیعی از معادلات انتگرالی ولترافردهلم خطی و غیرخطی بررسی شده است. در ابتدای این روش، یک شکل گسسته از جملات انتگرال در نظر گرفته شده و با در نظر گرفتن بعضی شرایط روی هسته معادله انتگرال نشان داده شده است که جواب شکل گسسته شده به جواب دقیق مسئله همگراست. آنگاه جواب شکل گسسته‌سازی شده به وسیله یک روش تکراری تقریب زده شده است. مقایسه جواب تقریبی با جواب دقیق نشان می‌دهد که روش استفاده شده آسان و قابل بکارگیری برای رده‌ای از معادلات انتگرالی ولترافردهلم خطی و غیرخطی می‌باشد.

Mangasarian-Fromovitz and Zangwill Conditions for Non-Smooth Infinite Optimization Problems in Banach Spaces

N. Kanzi

Department of Mathematics, Payame noor University (PNU), Tehran, Iran.

در این مقاله، مسائل بهینه سازی مقید شامل تعداد نامتناهی قید نامساوی در نظر گرفته شده‌اند. مسائل مورد نظر، روی یک فضای بanax تعریف شده، و تابع هدف و توابع قید، موضع‌اً لیپ شیتر هستند. هدف از ارائه شرایط لازم بهینگی برای مسائل فوق، تحت فیدهای تعریفی زانگویل و مانگاساریان- فرمولویتز، توسط زیرمشتق میشل-پینت می‌باشد.

A Generalized Singular Value Inequality for Heinz Means

A. Sheikh Hosseini

Department of Mathematics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman,
Iran.

در این مقاله به تعمیم نامساوی با مقدار تکینی که در گذشته ثابت شده است، پرداخته می شود. بویژه به بیان یک نامساوی برای شعاع عددی مانند:

$$2\sqrt{t(1-t)}\omega(tA^vB^{1-v} + (1-t)A^{1-v}B^v) \leq \omega(tA + (1-t)B),$$

می پردازیم که در آن A و B ماتریس های نیمه معین مثبت هستند و $0 \leq t \leq 1$ و $.0 \leq v \leq 3/2$

Free Extended *BCK*-Module

R. A. Borzooei^a, S. Saidi Goraghani^b

^aDepartment of Mathematics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

^bDepartment of Mathematics, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

در این مقاله، با در نظر گرفتن واژه BCK -مدول تعمیم یافته، مفاهیم BCK -مدول تعمیم یافته آزاد و شیع آزاد در رسته BCK -مدول های تعمیم یافته را ارائه کرده و تاییجی را در مورد آنها بیان و اثبات می کنیم. به ویژه، واژه BCK -مدول تعمیم یافته خود توان را تعریف کرده و نتایج مهمی را در BCK -مدول های تعمیم یافته آزاد به دست می آوریم. در رسته BCK -مدول های تعمیم یافته خود توان، روشی برای ساختن شیع آزاد روی یک مجموعه نا هی ارائه می دهیم. همچنین در BCK -جبرهای مرتبه 2، روشی برای ساختن BCK -مدول های تعمیم یافته یکانی بیان می کنیم. بالاخره، مفاهیم BCK -مدول های ضربی و پروژکتیو را ارائه داده و رابطه ی بین BCK -مدول های آزاد و پروژکتیو را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین، رابطه ی بین BCK -مدول های آزاد و ضربی را بیان می کنیم.

Lie Ideals and Generalized Derivations in Semiprime Rings

V. De Filippis^a, N. Ur Rehman^b, A. Z. Ansari^c

^aDepartment of Mathematics and Computer Science, University of Messina,
98166 Messina, Italy.

^bDepartment of Mathemaics, Faculty of Science, Taibah University,
Al-Madinah, Al-Munawara, KSA.

^cDepartment of Mathematics, Faculty of Science, Islamic University in
Madinah, KSA.

فرض کنید که R یک حلقه 2-بدون تاب و L یک ایده آل لی از R باشد. یک نگاشت جمعی $F : R \rightarrow R$ یک مشتق تعیین یافته روی R نامیده می‌شود، هرگاه یک مشتق $F(xy) = F(x)y + xd(y)$ موجود باشد بطوریکه به ازای هر $x, y \in R$ داشته باشیم مانند $d : R \rightarrow R$ در این مقاله، به توصیف عمل مشتق تعیین یافته که در برخی از شرایط روی ایده آل های لی حلقه های نیمه اولیه صدق می کنند، خواهیم پرداخت.

p-Analog of the Semigroup Fourier-Steiltjes Algebras

M. Shams Yousefi

Department of Pure Mathematics, Faculty of Mathematical Science,
University of Guilan, Rasht, Iran.

در این مقاله P -صورت نمایش های تحدید شده و P -صورت جبرهای فوریه اشتیل پس را روی نیم گروه های وارونی تعریف می کنیم و همچنین برخی نتایج در مورد جبرهای هرتس روی نیم گروه های کلیفورد را بهبود می بخسیم. در انتهای مقاله، شرط لازم و کافی میانگین پذیری این جبرها را روی نیم گروه های کلیفورد ارائه می کنیم.

Generalized Douglas-Weyl Finsler Metrics

M. H. Emamian, A. Tayebi

Department of Mathematics, Faculty of Science University of Qom, Qom, Iran.

در این مقاله، مترهای داگلاس-ویل تعمیم یافته را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. شرایطی را بدست می‌آوریم که تحت آن، کلاس مترهای داگلاس-ویل تعمیم یافته با S -انحنای صفر به کلاس مترهای بروالدی تحلیل می‌یابند.

On the Elliptic Curves of the Form $y^2 = x^3 - pqx$

H. Daghig, S. Didari

Department of Mathematics, University of Kashan, Kashan, Iran.

با توجه به قضیه موردل-ویل، گروه نقاط گویا روی یک خم بیضوی روی یک میدان عددی یک گروه آبلی متناهی تولید شده است. این مقاله رتبه خانواده خم‌های بیضوی $E_{pq} : y^2 = x^3 - pqx$ ، که در آن p و q اعداد اول متمایز هستند را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این مقاله، با فرض درست بودن حدسی از شینزل و سرپینسکی، خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های بیضوی به شکل $y^2 = x^3 - pqx$ با رتبه‌های ۲، ۳ و ۴ ارائه می‌کنیم.

Generalized Degree Distance of Strong Product of Graphs

K. Pattabiraman, P. Kandan

Department of Mathematics, Annamalai University, Annamalainagar 608 002,
India.

در این مقاله به بیان یک فرمول دقیق برای شاخص‌های فاصله درجه تعمیم یافته، فاصله درجه و فاصله درجه متقابل گراف‌های چندبخشی کامل با بخش‌هایی با اندازه‌های m_0, m_1, \dots, m_{r-1} می‌پردازیم. سپس با استفاده از این نتایج، به یافتن فرمولی برای شاخص‌های فاصله درجه و فاصله درجه متقابل گراف‌های حصاری خواهیم پرداخت.

EL^2 -hyperstructures Derived from (Partially) Quasi Ordered Hyperstructures

S. H. Ghazavi^a, S. M. Anvariye^a, S. Mirvakili^b

^aDepartment of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran.

^bDepartment of Mathematics, Payame Noor University,
P.O. Box 19395-3697, Tehran, Iran.

در این مقاله، ابتدا یک رده از (نیم) ابرگروهها را معرفی خواهیم کرد که بر اساس یک تعمیم از EL -ابرساختارها روی (نیم) ابرگروههای شبه (جزئ) مرتب ساخته می شوند. همچنین برخی خواص اساسی و نیز عناصر مهم در این رده از ابرساختارها را مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

On the Computational Complexity of the Domination Game

S. Klavžar^{a,b,c}, G. Košmrlj^d, S. Schmidt^e

^aFaculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana, Slovenia.

^bFaculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor,
Slovenia.

^cInstitute of Mathematics, Physics and Mechanics, Ljubljana, Slovenia.

^dAbelium, R&D d.o.o., Ljubljana, Slovenia.

^eInstitut Fourier, SFR Maths `a Modeler, Joseph Fourier's University,
Grenoble, France.

بازی غالب روی یک گراف دلخواه G , توسط دو بازیکن بازی انجام می شود. اینکه چه موقع عدد بازی غالب برای یک گراف داده شده به ازای یک عدد صحیح k کران دار است، مسئله PSPACE-کامل است. در این مقاله، نشان می دهیم که این مسئله برای یک گراف دلخواه G در مرتبه زمانی $\mathcal{O}(\Delta(G) \cdot |V(G)|^k)$ قابل حل شدن است. بویژه در حالتی که $k = 3$ باشد و گراف G دارای بزرگترین قطر باشد، مرتبه زمانی را می توان به $\mathcal{O}(|V(G)| \cdot |E(G)| + \Delta(G)^3)$ بهبود بخشید.